



الأسباب

- تتنح الذبحة الصدرية عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب. الدم يحمل الأكسجين، وهو ما تحتاجه عضلة القلب حتى يمكن العيش. عندما لا تحصل عضلة القلب على أكسجين كافي
- ويتمثل السبب الأكثر انتشاراً لانخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب في مرض الشريان التاجي يمكن أن تضيق الشرايين القلبية (التاجية) بسبب ترسبات دهنية. ويسمى هذا بتصلب الشرايين
- يعتبر تدفق الدم المنخفض مشكلة في الإمداد — حيث لا يحصل القلب على الدم الممتنع بالأكسجين بما يكفي



مقدمة

- تعمل عضلة القلب كمضخة لتوصيل الدم إلى جميع أنحاء الجسم وتحصل عضلة القلب على ما تحتاجه من طاقة (أوكسجين) لأداء تلك المهمة عن طريق الدم الذي يصلها عن طريق الشرايين التي تغذيها وعددتها ثلاثة تسمى بالشرايين الاقليلية أو التاجية، والذبحة الصدرية هي الأعراض التي تحدث للمريض عند نقصان الدم الساري في الشرايين التاجية المغذية لعضلات القلب والناتج عن عدم التوازن بين استهلاك القلب للغذاء ونسبة وصول الغذاء إليه



الذبحة الصدرية

إعدار

تحت إشراف قسم تمريض صحة المجتمع

كلية التمريض - جامعة بنها
٢٠١٩ - ٢٠٢٠

- الذبحة عبارة عن نوع من ألم الصدر الناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب. وتعد الذبحة أحد أعراض مرض الشريان التاجي.
- غالباً ما توصف الذبحة ، التي قد تسمى أيضاً الذبحة الصدرية، بأنها اعتصار في الصدر، أو ضغط، أو ثقل، أو شد، أو ألم يعترونه. يصف بعض من يعانون أعراض الذبحة بأنها شعور يشبه ملزمة تعتصر الصدر، أو حمل ثقيل موضوع عليه. قد تكون الذبحة المما جديداً يحتاج إلى تقييم من الطبيب، أو المما متكرراً يزول بالعلاج.

عوامل الخطر



- ١- استخدام التبغ
- ٢- داء السكري
- ٣- ارتفاع ضغط الدم
- ٤- ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم
- ٥- تاريخ عائلي للإصابة بمرض قلبي
- ٦- كبر السن
- ٧- عدم ممارسة الرياضة
- ٨- السمنة
- ٩- الضغط النفسي

العلاج

هناك العديد من الخيارات لعلاج الذبحة الصدرية، منها تغيير نمط الحياة، والأدوية، والأوعية الدموية والدعامات. تمثل أهداف العلاج في تقليل وتيرة الأعراض وشدتها والحد من خطر الإصابة بنوبة قلبية والوفاة

الأدوية

قد تحتاج إلى تناول الأدوية إذا لم يساعد نمط حياتك وحده في تحسن الذبحة التي تعاني منها. قد يتضمن هذا:

- ١- النترات
- ٢- الأسبرين
- ٣- الأدوية الوقية من الجلطات
- ٤- محصرات مستقبلات بيتا
- ٥- أدوية الستاتينات
- ٦- محصرات قنوات الكالسيوم
- ٧- أدوية خفض ضغط الدم
- ٨- رانولازين

الإجراءات الطبية والجراحية

- ١- تركيب دعامة يمكن بواسطتها توسيع الشريان الضيق
- ٢- في حالة فشل الدعامة يتم عمل عملية قلب مفتوح

الأعراض

- ١- المَأْفِي الصدر أو شعوراً بعدم الراحة والذي يمكن أن يُوصف بالشعور بالضغط أو العصر
- ٢- المَأْفِي في الذراعين، أو الرقبة، أو الفك، أو الكتف، أو الظهر مصحباً لألم الصدر
- ٣- الغثيان
- ٤- الإرهاق
- ٥- ضيق النفس
- ٦- التعرق
- ٧- الدوخة